

TEMA: Salud

SUBTEMA: Covid Mortalidad Materna

REFERENCIA: Excelsior. (22 de julio). Covid-19 primera causa de mortalidad materna en México: Salud. Recuperado de <https://bit.ly/3fX1arY>

NOTA:

Covid-19 primera causa de mortalidad materna en México: Salud

La Secretaría de Salud informó que, con 83 decesos, que representan el 19 por ciento del total de casos de mortalidad materna, el coronavirus se convirtió en la primera causa de muerte en mujeres embarazadas en nuestro país.

A la fecha, 2 mil 842 mujeres embarazadas se han contagiado de Covid-19, donde el 88 por ciento de los casos se detectaron durante el embarazo y el 12 por ciento durante el puerperio.

No obstante, se aclaró que toda muerte materna deberá ser analizada por los Comités de Salud, para dictaminar si el fallecimiento fue por coronavirus o por otras causas directas o indirectas, ya que a pesar de una prueba positiva de COVID-19, el fallecimiento podría haberse presentado por otros padecimientos.

Y ante el miedo a contagiarse del virus SARS-CoV-2, que han manifestado las mujeres embarazadas al acudir a sus consultas prenatales, se les exhortó a seguirse atendiendo y solicitar atención médica inmediata ante cualquier anomalía por mínima que sea.

Al respecto, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, añadió que en general, la población no debe considerar como un peligro de contagio asistir a una consulta para una enfermedad diferente a coronavirus porque la reconversión hospitalaria del sector salud habilitó hospitales Covid y no Covid.

COMENTARIO

La Secretaría de Salud informó que, con 83 decesos, que representan el 19% del total de casos de mortalidad materna, el coronavirus se convirtió en la primera causa de muerte en mujeres embarazadas en nuestro país. Este dato es alarmante, ya que muchas mujeres embarazadas no realizan visitas periódicas programadas a hospitales por miedo a contraer COVID-19, poniendo en riesgo su salud y la de sus bebés.

Por otro lado deja claro que no se ha dado un distanciamiento adecuado de los pacientes diagnosticados con COVID-19 de otros pacientes, pues el cambio en el indicador de mortalidad materna deja claro que al ingresar a un hospital público se corre un alto riesgo de contagio, situación que debe ser atendida y controlada a la brevedad.

El gobierno ha establecido hospitales en donde se atienden a pacientes con coronavirus y hospitales en donde no, pero resulta fundamental hacer mayor difusión con la lista de hospitales, clínicas y centros de salud que están destinados a seguir con la atención habitual del sistema de salud, para que las mujeres embarazadas lleven un seguimiento y tratamiento correcto para disminuir la tasa de defunciones en embarazadas a causa del virus.

RESPONSABLE

